

วิธีป้องกัน



สวมรองเท้าบูทยาง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้บาดแผลสัมผัสสู่กุน้ำ

หลีกเลี่ยงการลุยน้ำลุยโคลน

รีบล้างเท้าให้สะอาดด้วยสบู่
และเช็ดให้แห้ง



องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระวาน

๑๑ หมู่ที่ ๑ ต.ปากกระวาน

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา

สุนัข ระวังโรคฉี่หนู
Leptospirosis



Leptospirosis


เชื้อถูกปล่อยออกมาจากปัสสาวะของสัตว์
ที่ติดเชื้อและปนเปื้อนอยู่ตามน้ำ ดินที่
เปียกชื้น หรือพืช ผัก เชื้อสามารถเข้าสู่
ร่างกายทางผิวหนังตามรอยแผล รอยขีด
ข่วนและเยื่อของปาก ตา จมูก



พาหะหลัก คือ หนู หรือ
สัตว์ฟันแทะ



พาหะรอง คือ สุนัข วัว
และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม



ระยะฟักตัว ของเชื้อโรค
โดยเฉลี่ยประมาณ 10 วัน
หรืออยู่ในช่วง 4-19 วัน

อาการผู้ป่วยโรคฉี่หนู

- ✓ ใช้สוגนัปลัน ปวดศีรษะ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
- ✓ โดยเฉพาะบริเวณน่อง
โคนขา หรือปวดหลัง
- ✓ มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง
- ✓ ตัวเหลือง ตาเหลือง
ซึม สับสน
- ✓ ไอบีเลือดปน

